

Creazione della vagina, nei casi in cui è assente o poco sviluppata, attraverso un metodo non chirurgico

Molte ragazze affette da Sindrome da Insensibilità agli Androgeni (Sindrome di Morris) e tutte quelle affette da Sindrome di Rokitansky si trovano a dover affrontare il problema dell'ipoplasia vaginale. Questa condizione viene accertata da un ginecologo, ma quasi sempre la soluzione del problema viene affidata alla chirurgia.

Esistono diverse e sempre migliori tecniche chirurgiche di costruzione della vagina e su di esse si trovano molte pubblicazioni nella letteratura medica.

Tuttavia negli ultimi anni, soprattutto all'estero, è stata sperimentata con successo una tecnica non-chirurgica basata sull'applicazione di dilatatori in plastica di dimensioni crescenti. Questa tecnica può essere praticata a casa dalla paziente stessa, ha un costo molto basso, dà ottimi risultati in pochi mesi e non ha inconvenienti (se non dovesse riuscire si può sempre ricorrere all'intervento chirurgico).

Segnaliamo sotto alcune pubblicazioni scientifiche che illustrano più in dettaglio la tecnica ed i risultati ottenuti. Aggiungiamo che parecchie ragazze con cui il nostro gruppo di supporto è in contatto ci hanno testimoniato di aver avuto risultati molto soddisfacenti.

Purtroppo sembra che in Italia non ci siano ginecologi che possano indicare alle pazienti questa terapia e seguirle durante lo svolgimento della cura. O forse qualcuno è a conoscenza, ma c'è poca circolazione dell'informazione.

Succede così che una patologia che potrebbe essere di pertinenza del ginecologo diventa oggetto di intervento chirurgico, con maggiore dispendio di risorse economiche e di sofferenza.

Invitiamo i ginecologi che hanno esperienza in merito a contattarci.

Per coloro che vogliono saperne di più segnaliamo la seguente:

[Letteratura medica](#)

[Lappohn R.E.](#)

Congenital absence of the vagina – results of conservative treatment
European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology 59 (1995)
183-186

[Costa EM, Mendonca BB, Inácio M, Arnhold IJ, Silva FA, Lodovici O.](#)

Management of ambiguous genitalia in pseudohermaphrodites: new perspectives on vaginal dilation.

Fertil Steril. 1997 Feb;67(2):229-32.

PMID: 9022594 [PubMed - indexed for MEDLINE]

Carla P. Roberts, Michael J. Haber, John A. Rock

Vaginal creation for müllerian agenesis
American Journal of Obstetrics & Gynecology
Volume 185, Issue 6, (December 2001)
pages 1349-1353

Lee MH. All'indirizzo

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17191323?ordinalpos=2&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVDocSum

Non-surgical treatment of vaginal agenesis using a simplified version of Ingram's method.

Yonsei Med J. 2006 Dec 31;47(6):892-5.

PMID: 17191323 [PubMed - indexed for MEDLINE]

Ismail-Pratt IS, Bikoo M, Liao LM, Conway GS, Creighton SM. all'indirizzo

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17449508?ordinalpos=11&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVDocSum

Normalization of the vagina by dilator treatment alone in Complete Androgen Insensitivity Syndrome and Mayer-Rokitansky-Kuster-Hauser Syndrome.

Hum Reprod. 2007 Jul;22(7):2020-4. Epub 2007 Apr 20.

PMID: 17449508 [PubMed - indexed for MEDLINE]

Dal libro "Paediatric and adolescent gynaecology" Ed. Adam Balen et al, published by Cambridge University Press 2004, il capitolo: "A nonsurgical approach to the treatment of vaginal agenesis", a cura delle dott. Julie Alderson and Julie Glanville, Leeds, UK. (Vedi link sul sito, alla pagina "Dal mondo della ricerca")